



Servicios de Salud del Distrito Escolar Salt Lake City

Guía para las enfermedades que requieren Separación de los estudiantes
Separe a los estudiantes de acuerdo a los criterios listados debajo

CONJUNTIVITIS - OJO ROSADO: Se define como conjuntiva roja o rosada con descargas blancas o amarillentas, frecuentemente con los párpados pegados al despertar e incluyendo a un niño con dolor en el ojo, enrojecimiento de los párpados, o de la piel que rodea el ojo.

- Hasta que sea tratado con medicamentos recetados, durante 24 horas.

TOS:

- Tos excesiva y descontrolada.
- Acompañada por fiebre o sensación de malestar.

LLANTO/IRRITABILIDAD:

- El llanto persistente o irritabilidad pueden ser una señal de enfermedad.

DIARREA: Se define como un aumento en la cantidad de excrementos o un cambio en su consistencia comparándola con los hábitos usuales del niño.

- Dos o más deposiciones sueltas durante un día de clases.
- Incapaz de contener los excrementos en el inodoro o en el pañal.
- Acompañada por fiebre o sensación de malestar.

DIFICULTAD RESPIRATORIA

- Falta de aire.
- Sibilancia si no es previamente evaluada y tratada por un médico.

SUPURACIONES:

- Cualquier descarga incontenible por los oídos, nariz, boca o heridas abiertas.

FIEBRE: Se define como una temperatura corporal ≥ 100.4 F.

- Hasta que la temperatura esté dentro del rango normal durante 24 horas.

IMPÉTIGO:

- Hasta que las llagas se hayan secado o puedan cubrirse con un vendaje.
- O tratadas con medicamentos con receta durante 24 horas.

INFESTACIÓN:

- Sarna, hasta 24 horas después de empezar el tratamiento.
- Los piojos en la cabeza no requieren una separación de 24 horas (Vea la Política contra los Piojos del SLCS)

LLAGAS BUCALES:

- Exceso de llagas bucales que hacen muy incómodo asistir a clases.
- Acompañadas por fiebre.
- Incapacidad de tragar o excesiva secreción de saliva.

PARÁSITOS - OXIUROS:

- Hasta recibir el primer tratamiento de antibióticos orales.

SARPULLIDO:

- Cualquier sarpullido difuso que no hubiese sido previamente evaluada y tratada por un médico.
- Sarpullido acompañado por fiebre o sensación de malestar.

INFECCIÓN DE TIÑA:

- Hasta iniciar un tratamiento.

DOLOR DE GARGANTA:

- incapacidad de tragar (deglutir).
- Acompañada por fiebre o sensación de malestar.

INFECCIÓN DE ESTREPTOCOCOS:

- Hasta 24 horas después de haber empezado los antibióticos.
- Hasta que no haya habido fiebre por 24 horas.

VARICELA:

- Hasta que las lesiones hayan secado y hecho costra (alrededor de 6 días).

VÓMITO:

- Dos o más episodios de vómito en las últimas 24 horas.
- Cualquier vómito en la escuela acompañado de fiebre o sensación de malestar.